



הוראות לאחר פרוצדורה כירורגית

מייד לאחר הטיפול

- יש לנשך על ספוגית גזה למשך כ 10 דקות
- יש להימנע מאכילה כ 2-3 שעות לאחר העקירה (כל עוד ישנה הרדמה)
- על מנת למנוע נפיחות מומלץ לקרר את הפנים באזור הטיפול בעזרת קרח (עד 20 דקות כל פעם)
- לאחר שתפוג השפעת ההרדמה המקומית עלולים להופיע כאבים, בשל כך מומלץ לקחת תכשירים נגד כאבים ע"פ המרשם שבידך.
- מספר שעות לאחר הניתוח יש לצפות לדימום קל, אם הדימום מתגבר יש לקחת ספוגית גזה / שקית של תה ולהניח על אזור הניתוח תוך כדי הידוק על המקום ל 20 דקות.

ב 24 השעות לאחר הניתוח

- יש להמנע מאכילה ושתיה של מאכלים ומשקאות חמים
- יש להמנע מיריקה, עישון, שטיפה של הפה צחצוח שיניים ופעילות גופנית
- במידה ומופיע דימום יש לנשך על שקית תה יבשה / גזה.

לאחר 24 שעות

- יש להשתמש בשטיפות אנטיביוטיות - *Tarodent/Corsodyl* עד להורדת התפרים.
- במידה וניתנה לך אנטיביוטיקה יש לקחת עד גמר המנה ולא להפסיק באמצע.
- הורדת תפרים לאחר 7-10 ימים.

** במקרה של שטף דם, חום או כל תופעה סיסטמית אחרת יש ליצור קשר עם המרפאה

החלמה מהירה - ד"ר לוי גיא

0547-429252 / 08-9118867

WWW.DrGuy.co.il