



### תרופות

#### **אנטיביוטיקה**

- אוגמנטין במינון של 875 מ"ג, 2 כדורים ליום, כל 12 שעות במשך שבוע
- מוקסיפן במינון של 500 מג, 3 כדורים ביום כל 8 שעות במשך 5 ימים/שבוע
- דלצין C במינון של 150 מג, 4 כדורים ביום כל 6 שעות, לחלופין ניתן לקחת בבת אחד 2 כדורים פעמיים ביום

#### **סטרואידים**

- דקסה-מטזון - במינון של 2 מ"ג, 4 כדורים בבת את ביום הניתוח, 4 כדורים בבת אחד ביומיים שלאחר הניתוח.

#### **משככי כאבים**

- טבליות נרוסין במינון של 275 מ"ג - ניתן לקחת עד 2 כדורים ליום.
- אופטלגין (במידת הצורך) - כדור של 500 מ"ג / 35 טיפות.

#### **שטיפות פה**

- תרודנט/קורסודיל - גרגור למשך דקה פעמיים ביום, יש להתחיל את השימוש בו יום למחרת הניתוח.

#### **טיפות אף (לאחר הרמת סינוס)**

- אלרין - 2 טיפות בצד המנותח, יש להתחיל בבוקר למחרת הניתוח למשך שבוע